

# CASSISSIER

## *Ribes nigrum*

### Grossulariacées

#### CARACTÈRES DE VÉGÉTATION ET DE FRUCTIFICATION

**Silhouette :** Arbuste d'environ 1,50m de hauteur, à port dressé ou étalé en fonction des différentes variétés. .

**Tronc-écorce:** Rameaux à moelle, se développant surtout à la base du buisson, nombreux et rigides. L'écorce est souvent grise et lisse.

**Feuilles:** Feuilles palmatilobées, vert foncé, très odorantes. Face inférieure velue et garnie de glandes jaunâtres résineuses.

**Fleurs ou inflorescences :** L'inflorescence est une grappe. Le bourgeon floral présent sur le jeune bois donne naissance à une longue grappe. Sur le vieux bois ce même bourgeon induira trois petites grappes. Les fleurs sont unisexuées en forme de petites cloches ,vert rougeâtre. Elles sont mellifères, pollinisées par les bourdons et sensibles au gel. De nature autostérile le cassissier réclame des pollinisateurs.(20 à 25%)

**Fruit :** Baies noires, brillantes ou légèrement pruinées au parfum bien prononcé. Le cassis est riche en vitamines C et permet une meilleure circulation du sang.

#### ADAPTATION AU SOL

Rechercher de préférence les sols silico-argileux et silico-argileux calcaires, frais et profonds.

En sol acide les rendements sont plus élevés mais les fruits sont moins parfumés. ( Arômes plus prononcés en terrain calcaire).



#### ADAPTATION AU CLIMAT

Arbuste des contrées nordiques, le cassissier nécessite des besoins en froid élevés. Si ces besoins ne sont pas satisfaits il y a mauvais débourrement et les fleurs avortent. De par sa floraison précoce, le cassissier craint le gel printanier.

## MULTIPLICATION

Le moyens de multiplication sont:


Le bouturage de rameaux ligneux .

Les boutures sont prélevées sur des rameaux d'un an vigoureux et sains. Ils sont coupées à 20cm de longueur et disposées en jauge dans du sable humide le long d'un mur au nord. Au printemps les boutures sont repiquées en pleine terre (1 oeil hors du sol), en ayant soin de les incliner.

Le marcottage par couchage

Les rameaux d'un an sont couchés au sol et maintenus par des cavaliers (sardines). Cette opération se déroule au printemps. L'enracinement est facilité si de petites incisions sont faites sur les tiges. Le sevrage est pratiqué en automne. Le marcottage est souvent naturel chez le Cassissier.

## BOUTURAGE



## PRINCIPALES MALADIES ET PRINCIPAUX RAVAGEURS

### Maladies cryptogamiques

Anthracnose provoquée par *Gloeosporium ribis*.  
Oïdium provoqué par *Podosphaera leucotricha*.  
Rouille provoquée par *Cronartium rubicola*.

### Ravageurs animaux

Cochenilles. Phalène (*Abrascas grossulariata*).  
Pucerons (Puceron jaune, Puceron vert).  
Pyrale des groseilles (*Zophodia convolutella*).  
Sésie (*Aegeria tipuliformis*).



**Feuille palmatilobée**



**Inflorescence en grappe**



**Baies noires riches en vitamine C**



**Rameaux d'un an avec  
bourgeons à bois**